


# DitEx

## ANWENDUNGSBEREICH

- **DESINTEC® DitEx** ist ein wasserlösliches Granulat aus der Gruppe der Neonicotinoide gegen adulte Fliegen, einschließlich der Essigfliegen in Tierställen
- Zucker und ein Sexuallockstoff machen **DitEx** sehr attraktiv für die Fliegen
- Fraß- und Kontaktinsektizid
- Hervorragende Sofortwirkung sowie eine Dauerwirkung von bis zu 6 Wochen
- Anwendung im Streichverfahren
- Für eine nachhaltige Fliegenreduzierung ist ein **kombinierter Einsatz von DESINTEC® DitEx gegen adulte Fliegen und DESINTEC® CyroEx gegen Larven** in der Gülle zu empfehlen.



## WIRKUNGSWEISE

Neonucleotide blockieren im Nervensystem der Insekten die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren an den postsynaptischen Membranen. Thiamethoxam zählt zu den Neonicotinoiden der neueren Generation mit abgewandeltem Wirkmechanismus im Vergleich zur vorherigen Generation der Neonicotinoide. Diese Neonicotinoide der neuen Generation zeigen ein sehr niedriges Resistenzpotential im Vergleich zu anderen Insektiziden wie z.B. Organophosphaten, Carbamaten oder Pyrethroiden.

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- Herstellung einer streichfähigen Flüssigkeit durch Zusammenrühren der notwendigen Menge **DitEx** mit der entsprechenden Menge lauwarmes Wasser bis eine streichfähige Emulsion entstanden ist.
- Die entstandene, streichfähige Emulsion mit einem Pinsel oder einer Rolle unverdünnt auf vielen kleinen Kartonagen (z. B. Desintec® Fliegenlandeplätze) oder Brettern der Größe 20 x 30 cm auftragen.
- Pro 80-120 m<sup>2</sup> Wandoberfläche 10 Kartonagen (oder Bretter) aufhängen.
- Bei Bedarf bestrichene Kartonagen/Bretter im Stall dort aufhängen, wo die Fliegen sich aufhalten (Leitungen, Boxentrennwände, Gänge) – jedoch außerhalb der Reichweite der Tiere.
- Falls erforderlich, kann die Behandlung nach 6 Wochen wiederholt werden.
- Erneut auftragen, wenn z.B. Staub die behandelte Fläche bedeckt hat.

# DitEx

## DOSIERTABELLE

Menge DitEx / ml lauwarmes Wasser			
100 g DitEx	250 g DitEx	400 g DitEx	1.000 g DitEx
in 80 ml Wasser	in 200 ml Wasser	in 320 ml Wasser	in 800 ml Wasser
Ausreichend für m <sup>2</sup> Wandfläche:			
120 m <sup>2</sup> Wandfläche	300 m <sup>2</sup> Wandfläche	480 m <sup>2</sup> Wandfläche	1.200 m <sup>2</sup> Wandfläche
oder bezogen auf m <sup>2</sup> Stallgrundfläche:			
~ 40 m <sup>2</sup> Grundfläche	~ 100 m <sup>2</sup> Grundfläche	~ 160 m <sup>2</sup> Grundfläche	~ 400 m <sup>2</sup> Grundfläche

- Streichemulsion am Tage der Herstellung verarbeiten.
- Wenn die Verarbeitung länger als 30 Minuten unterbrochen wird, muss die Streichemulsion erneut gründlich aufgerührt werden.

## ALLGEMEINE BEACHTUNG

- Während der Anwendung können die Nutztiere im Stall bleiben. Es muss aber sichergestellt sein, dass die Tiere die bestrichenen Pappen oder Bretter nicht erreichen bzw. ablecken können.
- Über- und vor allem Unterdosierungen sind zu vermeiden.
- Bei starker Staubentwicklung im Stall ist die Behandlung bei Bedarf zu wiederholen.
- Es kann zu einer schwachen Verfärbung der behandelten Flächen kommen.
- Behandelte Flächen vor direktem Lichteinfall, Wasser und Regen schützen

## WIRKSTOFF

100g / kg Thiamethoxam  
0,5g / kg Z-9-Tricosene

## ÖKOLOGIE

Giftig für Bienen

- Nicht in die Kanalisation, Oberflächengewässer oder Grundwasser gelangen lassen
- Reinigungsflüssigkeit nicht in die Kanalisation gelangen lassen
- Entsorgung von Resten als Sondermüll

## DitEx

### SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren anwenden
- Berührung mit der Haut vermeiden.
- Geeignete Schutzhandschuhe tragen
- Bei Behandlung von Flächen über Kopfhöhe Schutzmaske und Kopfbedeckung tragen
- Arbeitskleidung nach Beendigung der Mittelausbringung wechseln und unbedeckte Körperteile gut waschen
- Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeignete Anmischbehälter verwenden
- Pinsel und Anmischbehälter mit Wasser und Allzweckreiniger gründlich reinigen
- Pinsel nicht für andere Zwecke verwenden

Für Kinder und Unbefugte unzugänglich lagern

Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. Symptomatische Therapie anwenden

### LAGERUNG

An einem trockenen Ort nicht über 30°C im Originalgebinde lagern

### GEBINDEGRÖSSE

400 Gramm Dose

**BEI ALLEN REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN IST SCHUTZKLEIDUNG  
EINSCHLIEßLICH DICHTER SCHUTZBRILLE UND ATEMSCHUTZMASKE UNERLÄSSLICH!  
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!  
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!**

### **BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.**

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Sie ist keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität, jedoch keine Erfolgsgarantie, da die Anwendung von vielen, von uns nicht beeinflussbaren, Faktoren abhängig ist. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.