

# MegalEx

## ANWENDUNGSBEREICH

**MegalEx** ist ein Pastenköder zur Bekämpfung von Wanderratten im Aussenbereich

## EIGENSCHAFTEN

**Der Pastenköder** weist eine sehr gute Wasser-, Feuchte- und Schimmelbeständigkeit auf und eignet sich dadurch sehr gut zur Bekämpfung der Ratten schon im Aussenbereich. Der Wirkstoff hemmt die Blutgerinnung und macht die Wände der Blutgefäße durchlässig. Die Ratten sterben schmerzfrei innerhalb weniger Tage nach der Köderaufnahme an inneren Verblutungen.

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

**Der Pastenköder** sollte in Köderboxen ausgelegt werden. Sehr gut geeignet sind mindestens 60 cm lange Rohre mit einem Durchmesser von 10 cm. Gut geeignet sind auch die im Handel befindlichen Köderboxen aus Kunststoff. Die Köderstellen sollten im Abstand von ca. 10m entlang von Wänden an geschützten Stellen eingerichtet werden.

Die Attraktivität der Pastenköder wird durch Bestreichen mit z.B. Nutella erhöht.

Bei der Köderauslegung unbedingt Handschuhe tragen, zum einen zum Eigenschutz und zum anderen, weil der menschliche Hautgeruch die Tiere abschreckt,

Tool zur Ratten- und Mäusebekämpfung auf [www.desintec.de](http://www.desintec.de)

## DOSIERUNGSEMPFEHLUNGEN

Paste als Köderriegel im 100gr Portionsbeutel; zu Beginn der Beköderung immer 200g (2 Portionsbeutel) in die Köderstation legen.

## NACHBEHANDLUNGEN

Die Köderstellen müssen mindestens 2 mal pro Woche kontrolliert werden. Verbrauchte Ködermengen müssen ständig ersetzt werden bis kein Verbrauch mehr feststellbar ist.

# MegalEx

## CHEMISCHER AUFBAU

Coumatetralyl

## SICHERHEIT



MegalEx ist gesundheitsschädlich, sehr giftig, beim Verschlucken. Der Köder enthält zur Absicherung den für Menschen und Haustiere ungenießbaren Wirkstoff Bitrex<sup>®</sup>. Aus Sicherheitsgründen sollte der Pastenköder grundsätzlich nur in Köderboxen ausgelegt werden. Bei der Ausbringung Schutzhandschuhe tragen. Während der Anwendung nicht essen, trinken, rauchen.

Bei versehentlicher Aufnahme des Köders durch Menschen oder Haustiere unverzüglich Arzt oder Tierarzt hinzuziehen.

Das Gegenmittel (Antidot) für Coumatetralyl ist Vitamin K1 (Konakion). Bei schweren Vergiftungsfällen werden bis 20mg Konakion langsam intravenös verabreicht, mit Wiederholungen alle 2-3 Stunden.

**Unzugänglich für Kinder aufbewahren**

## GEBINDE

2,5kg Karton

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes.

REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!  
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!

**BIOZIDE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND  
PRODUKTINFORMATION LESEN.**