

RodEx Pastenköder

ANWENDUNGSBEREICH

RodEx Pastenköder ist ein wirkungsvolles Bekämpfungsmittel gegen Ratten und Mäuse im Haus und in Ställen

EIGENSCHAFTEN

Der Pastenköder hat eine sehr gute Wasser-, Feuchte- und Schimmelbeständigkeit. Der Wirkstoff ist ein s.g. single-dose-Wirkstoff, d.h. bereits bei der einmaligen Aufnahme einer geringen Menge ist die Wirkung hoch effektiv. Er hemmt die Blutgerinnung und macht die Wände der Blutgefäße durchlässig. Die Ratten und Mäuse sterben schmerzfrei innerhalb weniger Tage nach der Köderaufnahme an inneren Verblutungen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- gegen Mäuse: einzelne Riegel des RodEx Pastenköders werden an mehreren Stellen, an denen Mäuse gesehen oder vermutet werden, im Abstand von ca. 2m ausgelegt.
- gegen Ratten: mehrere Riegel des RodEx Pastenköders werden in Köderboxen an verschiedenen geschützten Stellen im Abstand von ca. 10m ausgelegt. Ratten nehmen den Köder am besten an dunklen, ruhigen und geschützten Orten (Köderboxen) auf.
- Die Attraktivität der Pastenköder wird durch bestreichen mit z.B. Nutella erhöht
- bei der Anwendung Schutzhandschuhe tragen. Der menschliche Hautgeruch kann eine ausreichende Köderaufnahme verhindern.

Tool zur Ratten- und Mäusebekämpfung auf www.desintec.de

DOSIERUNGSEMPFEHLUNGEN

- gegen Mäuse: 1 Riegel pro Köderstelle
- gegen Ratten: 2-3 Riegel pro Köderstelle

NACHBEHANDLUNGEN

Die Köderstellen müssen mindestens 2 mal pro Woche kontrolliert werden. Verbrauchte Ködermengen müssen ständig ersetzt werden bis kein Verbrauch mehr feststellbar ist.

RodEx Pastenköder

WIRKSTOFF

Difethialone 25mg/kg

SICHERHEIT

RodEx Pastenköder enthält den für Menschen und Haustiere ungenießbaren Wirkstoff Bitrex[®]. Aus Sicherheitsgründen sollte der Pastenköder grundsätzlich nur in Köderboxen ausgelegt werden.

Berührungen mit der Haut und mit den Augen vermeiden. Bei der Ausbringung Schutzhandschuhe tragen. Während der Anwendung nicht essen, trinken, rauchen.

Bei versehentlicher Aufnahme des Köders durch Menschen oder Haustiere unverzüglich Arzt oder Tierarzt hinzuziehen.

Das Gegenmittel (Antidot) für Difethialone ist Vitamin K1 (Konaktion). Bei schweren Vergiftungsfällen werden bis 20mg Konaktion langsam intravenös verabreicht, mit Wiederholungen alle 2-3 Stunden.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren

GEBINDE

2,5 kg

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes und der Produktinformation

REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!

**BIOZIDE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.**