

CyroEx

ANWENDUNGSBEREICH


- Bekämpfung von Fliegenlarven und Rattenschwanzlarven in Tierställen

EIGENSCHAFTEN

- **DESINTEC® CyroEx** ist ein Wachstumshemmer mit selektiver Wirkung gegen Fliegen- und Rattenschwanzlarven
- Nützlinge werden geschont
- Bisher keine Resistenz oder Kreuzresistenz bekannt
- Für Säugetiere nicht giftig, Anwendung im belegten Stall möglich

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG / Dosierung


500 g wasserlösliches Granulat für 20 m² Brutfläche



Streugranulat nur auf feuchten Mist:
500 g/20m²




Spritzen:
500 g / 5 Liter Wasser / 20 m² (Brutfläche)



Giessen:
500 g / 15 Liter Wasser / 20 m² (Brutfläche)

Für nachhaltigen Erfolg empfehlen wir eine Simultanbehandlung:

Gleichzeitige Anwendung dieses Larvizids und eines Adultizids (z.B. DESINTEC® NeoEx, DESINTEC® DitEx oder DESINTEC® AnoEx)



CyroEx

Wiederholungen der Behandlung

- bei Erstanwendung ausschließlich mit DESINTEC® CyroEx nach 2 Wochen
- in der Routine ausschließlich mit DESINTEC® CyroEx nach 6-8 Wochen
- bei einer Simultananwendung ist es ausreichend, wenn nach Wiederauftreten der Fliegen die nächste Simultanbehandlung stattfindet

Wirkstoff

2g Cyromazin / 100g

Sicherheit

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Gebinde

1kg Dose, 5 kg Eimer, 12 kg Eimer und 20 kg Sack

BEI ALLEN REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN IST SCHUTZKLEIDUNG EINSCHLIEßLICH DICHTER SCHUTZBRILLE UND ATEMSCHUTZMASKE UNERLÄSSLICH!
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONS-MITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!

BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.