


LopridEx

ANWENDUNGSBEREICH

- **DESINTEC® LopridEx** ist ein wasserlösliches, braunes Granulat mit einem Wirkstoff aus der Gruppe der Neonicotinoide gegen adulte Fliegen in Tierställen.
- Zucker und ein Sexuallockstoff machen **LopridEx** sehr attraktiv für die Fliegen.
- Fraß- und Kontaktinsektizid.
- Hervorragende Sofortwirkung sowie eine Dauerwirkung von bis zu 6 Wochen.
- Anwendung im Streichverfahren.
- Für eine nachhaltige Fliegenreduzierung ist ein **kombinierter Einsatz von DESINTEC® LopridEx gegen adulte Fliegen und DESINTEC® CyroEx gegen Larven** in der Gülle zu empfehlen.



WIRKUNGSWEISE

Neonicotinoide blockieren die Weiterleitung von Nervenreizen im Nervensystem der Insekten. Der Rezeptor wird so dauerhaft stimuliert und es kommt zu einer Störung der chemischen Signalübertragung. Imidacloprid wirkt sowohl als Fraß- als auch als Kontaktgift gegen Fliegen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- Beginnen Sie die Behandlung mit Beginn der Fliegensaison (Frühjahr), um eine massive Vermehrung zu vermeiden.
- 250 g LopridEx in 250 ml Wasser auflösen und z.B. mit einem Pinsel oder einer Rolle auf kleine, nicht saugfähige Kartonagen auftragen. Diese Menge reicht für einen Stall mit einer Bodenfläche von 100 m².
- Die Kartonagen dort im Stall aufhängen, wo sich die Fliegen aufhalten (Leitungen, Boxentrennwände, Gänge) – jedoch außerhalb der Reichweite von Tieren.
- Lassen Sie einen unbehandelten Bereich rund um die bestrichenen Kartons herum frei, damit diese befestigt und aufgesammelt werden können, ohne mit dem Produkt in Berührung zu kommen. Waschen Sie bestrichene Kartons nicht ab, sondern entfernen Sie die Kartons bei der Reinigung oder Desinfektion des Stalls.
- Falls erforderlich, kann die Behandlung nach 6 Wochen wiederholt werden, maximal 6 Anwendungen pro Jahr.
- Erneut auftragen, wenn z.B. Staub die behandelte Fläche bedeckt hat.

LopridEx

- Hergestellte Lösung am Tage der Herstellung verarbeiten.

ALLGEMEINE BEACHTUNG

- Nur für den professionellen Gebrauch.
- Während der Anwendung können die Nutztiere im Stall bleiben. Es muss aber sichergestellt sein, dass die Tiere die bestrichenen Pappen nicht erreichen bzw. ablecken können.
- Bei starker Staubentwicklung im Stall ist die Behandlung bei Bedarf zu wiederholen.
- Behandelte Flächen vor direktem Lichteinfall, Wasser und Regen schützen.

WIRKSTOFF

100g / kg Imidacloprid
Cis-tricos-9-en (Muscalur)

ÖKOLOGIE

- Das unbenutzte Produkt, seine Rückstände und das Waschwasser der Geräte dürfen nicht in den Boden, in Wasserläufe, in die Kanalisation (Waschbecken, Toiletten usw.) oder in Drainagesysteme gelangen.
- Entsorgung von Resten als Sondermüll.

SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren lagern und anwenden. Fernhalten von Nahrungsmitteln, Getränken und Tierfutter.
- Das Tragen von Handschuhen und Schutzkleidung wird empfohlen.
- Kontaminierte Geräte (z. B. Pinsel) nicht in einem Waschbecken waschen.

LAGERUNG

An einem dunklen, trockenen Ort nicht über 30°C im Originalgebinde lagern.

GEBINDEGRÖSSE

500-Gramm Dose

LopridEx

BEI ALLEN REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMAßNAHMEN IST SCHUTZKLEIDUNG
EINSCHLIEßLICH DICHTER SCHUTZBRILLE UND ATEMSCHUTZMASKE UNERLÄSSLICH!
REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!
NICHT MIT ANDEREN CHEMISCHEN WIRKSTOFFEN (Z.B. DESINFEKTIONSMITTELN) MISCHEN!

BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Sie ist keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität, jedoch keine Erfolgsgarantie, da die Anwendung von vielen, von uns nicht beeinflussbaren, Faktoren abhängig ist. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.